

## Решавање линеарних једначина у којима се непозната појављује само у једном члану

Једначина је **математички појам** који изражава везу између познатих и непознатих величина посредством знака једнакости који изједначава леву и десну страну једначине.

Решавање једначине се састоји од одређивања које вредности променљивих чине једнакост тачном. Променљиве се исто тако називају **непознатима** и вредности непознатих које задовољавају једначину се називају **решењима** једначине.

**Пример 1:** Решити једначину  $9 - 2x = 5x + 2$

Нема разломака и заграда тако да одмах “пребацијемо” непознате на једну а познате на другу страну.

$$\begin{aligned}9 - 2x &= 5x + 2 \\- 2x - 5x &= +2 - 9 \\- 7x &= -7\end{aligned}$$

$$x = \frac{-7}{-7}$$

$$x = 1$$

Пример 2: Решити једначину  $3(2 - 3x) + 4(6x - 11) = 10 - x$

$$9 - 2x = 5x + 2$$

$$-2x - 5x = +2 - 9$$

$$-7x = -7$$

$$x = \frac{-7}{-7}$$

$$x = 1$$

---

Домаћи задатак:

Решити једначине:

a)  $-5x + 3 = -12$

б)  $3(x + 1) = -9$

в)  $\frac{1}{5}x + \frac{3}{5} = -2$

г)  $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} = 1$